



**UWAGA ODRA! Warto wiedzieć że jest to choroba wirusowa /
УВАГА КІР! Варто знати, що існує вірусне захворювання**



UWAGA ODRA

Warto wiedzieć że jest to choroba wirusowa, Odra to choroba zakaźna wieku dziecięcego. Jedynym sposobem uniknięcia choroby i jej powikłań jest **szczepienie ochronne**. Zakażenie osoby **nieodpornej** prowadzi zawsze do zachorowania. *. Bieżąca sytuacja epidemiologiczna jest niepokojąca, wzrasta liczba zachorowań na odrę w Europie, najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290), Włoszech (2 248). W tym samym czasie na Ukrainie odnotowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry występuje również w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Łotwie.*

Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub powietrzno-kropelkową przez bezpośredni kontakt z zakażonym.

Objawy kliniczne Choroba przebiega z wysoką gorączką (do 40°C), zapaleniem spojówek i światłowstrętem, katarzem, suchym, bardzo bolesnym i męczącym kaszlem. Na skórze widoczna jest żywoczerwona zlewająca się wysypka.

Komplikacje tej choroby są częste: szczególnie u bardzo małych dzieci i u dorosłych powyżej 20 roku życia.

Metodą zapobiegania jest zaszczepienie się osoby nieuodpornionej.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pobytu, bądź po powrocie z podróży z terenów na których występują zachorowania – należy natychmiast skontaktować się ze z lekarzem.



Opracował: GSSE







УВАГА КІР

Варто знати, що існує вірусне захворювання, кір. Кір - гостре дитяче інфекційне захворювання. Немає ліку, який знищував би віруса кору. Зараження людини зі зниженою опірністю завжди доводить до захворювання, у багатьох випадках до серйозних ускладнень. Одиноким способом уникнення захворювань та їх ускладнень є профілактичні щеплення. Кір – надалі дуже серйозна загроза для здоров'я дітей: це восьма причина смерті на світі, протягом року помирає з приводу кору й ускладнень понад мільйон людей.

Зараження крапельним шляхом або повітряно – крапельним шляхом внаслідок безпосереднього контакту з інфікованим.

Клінічні ознаки: захворювання перебігає з підвищеною температурою (до 40 градусів за Цельсієм), гнійним запаленням кон'юнктиви, нежиттю, сухим, дуже болючим і виснажуючим кашлем. Шкірні зміни у вигляді яскравочервоного розлитого висипання. Часто трапляються ускладнення цієї хвороби, особливо у дуже малих дітей та дорослих вище 20 - ти років.

Методом профілактики є щеплення згідно з календарем щеплень, перед виїздом до країн Східної Європи, а також індивідуально протягом перших 72 годин від контакту з хворим.

У випадку виявлення ознак захворювання під час перебування на ендемічній території або після повернення з подорожі – треба якнайшвидше консультуватися з лікарем.

Опрацював GSSE





Obrazy

Zarazenia людини зі зникненою опірністю завжди доводять до захворювання, у багатьох випадках до серйозних ускладнень. Одним з способів уникнення захворювань та їх усунування є профілактичні щеплення. Їх – надано дуже серйозна загорода для здоров'я дітей: це восьма причина смерті на світі, протягом року помирає з приводу кору й ускладнень понад мільйон людей.

Зараження крапельним шляхом або повітряно – крапельним шляхом викликає безпосереднього контакту з інфікованим.

Клінічні ознаки: захворювання перебігає з підвищеною температурою (до 40 градусів за Цельсієм), нйним запаленням кон'юнктив, нежиттю, сухим, дрібним болісним і виснажливим кашлем. Шкіра змінює у вигляді яскраво-червоного розсіяного висипання. Часто трапляються ускладнення цієї хвороби, особливо у дуже малих дітей та дорослих вище 20 - ти років.

Методом профілактики є щеплення згідно з календарем щеплень, перед виїздом до країн Східної Європи, а також індивідуально протягом перших 72 годин від контакту з хворим.

У випадку виявлення ознак захворювання під час перебування на ендемічній території або після повернення з подорожі – треба негайно відвідати лікаря.

Захворювання викликають, викликають тільки інфекційний протекти, викликають на захворювання. Висока ступінь епідеміологічного, як історичного, виступає лише захворювань на одні в Європі, найвищою захворюваністю виступає в Румунії (5 100 випадків), Франції (2 702), Греції (2 296), Німеччині (2 248). В той самий час на [Україні](#) відомо понад 32 000 випадків одні. Проблеми одні зустрічаються рідше в Чехії, Словаччині, Польщі, на Угорщині, Болгарії, Латвії, Литві.

До захворювання dochodzi drogą kropelkową lub powietrzno-kropelkową przez bezpośredni kontakt z zakażonym.

Objawy kliniczne Choroba przebiega z wysoką gorączką (do 40°C), zapaleniem spojówek i światłowostem, katarrem, suchym, bardzo bolesnym i męczącym kaszlem. Na skórze widoczna jest żywoczerwona złazająca się wysypka. **Komplikacje tej choroby są częste: szczególnie u bardzo małych dzieci i u dorosłych powyżej 20 roku życia.**

Metodą zapobiegania jest zaszczepienie się osoby nieuodpornionej.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w trakcie podróży, bądź po powrocie z podróży z terenów, na których występuje zachorowania – należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.